

内視鏡的逆行膵胆管造影法(ERCP)を受けられる方へ

1/1枚目

日付		/		/		/		/				
経過		入院		検査前		検査後		検査後1日目		検査後2日目		
治療・検査	測定	体温、脈拍、血圧を測定します。 		体温、脈拍、血圧を測定します。		体温、脈拍、血圧を測定します。 (検査後、2時間後、眠前)		体温、脈拍、血圧を測定します。(1日3回) 		体温、脈拍、血圧を測定します。(1日2回) 		
	安静度	安静の制限はありません。 				検査後2時間はベッド上安静です。  2時間以降はトイレのみ歩行できます。初めて歩行する際には看護師とともにふらつかないかを確認します。		病棟内のみ歩行できます。		安静の制限はありません。 		
		レントゲン、心電図、採血を行います。 				検査から2時間後、主治医の指示がある場合には採血をします。		ENBDを実施した場合は、細いチューブが鼻から出ており、その先端には排液用のボトルが付いています。チューブが抜けないように鼻にテープで固定し、看護師が毎日張り替えます。移動する際はボトルを持ち歩いていただきます。				
	処方	いつも飲んでいる薬の確認をします。		主治医の指示に従って薬を飲みます。 昼の薬は中止します。		主治医の許可があれば薬を再開します。 						
	注射			持続点滴を行います。 膵酵素阻害剤の点滴も行います。(点滴の針を2本いれます。) 		持続点滴、抗生剤の点滴を行います。 		持続点滴、抗生剤の点滴を行います。 				
食事	朝 			食事・水分はとらないでください。				飲水ができます。 		主治医の許可がある食事が食べれます。 		
	昼 			食事・水分はとらないでください。				飲水ができます。 (採血の結果で食事開始)				
	夕 	夕食まで食べることができます。 				食事・水分はとらないでください。 医師の許可がある場合には水分をとることができます。		食事が開始となります。				
清潔		シャワーができます。 						身体を拭くことができます。 				
注意点等				入れ歯や時計、指輪ネックレスなどの金属、湿布など外せるものは外します。		腹痛や吐き気がある際には看護師に知らせてください。						

※予定であり状態によって変更になることがあります。変更があれば、検温の際に受け持ちが説明します。