

人工股関節置換手術を受けられる方へ

1/2枚目

日付	/		/		/	
経過	入院日	手術前1日目	手術前	手術中	手術後	
治療	測定	体温、脈拍、血圧を測定します。 	手術室に行く前に体温、脈拍、血圧を測定します。	 手術は全身麻酔で行います。	手術の後は、時間ごとに体温、脈拍、血圧を測定します。その際に足の動きや感覚も確認します。	
	安静度	安静の制限はありません。 	自分で歩いて、または車いすで手術室へ入室し、手術室の看護師と手術の準備と引き継ぎをします。		ベッドで安静です。足の間に脱臼予防の枕を挟んでいます。体の向きを変えるときは看護師と一緒にいきます。	
	処方	薬剤師がいつも飲んでいる薬の確認をします。手術に関係する薬は医師の指示に従い休止します(血液をサラサラにする薬など)。 	お薬を飲んでいる方は指示されたお薬のみ飲んでいただきます。 			
	注射				点滴をします。痛みが強い場合は点滴や坐薬などで対応します。医師の指示により輸血を行う場合もあります。 	
	リハビリ	必要に応じてリハビリテーションを行います。				
処置	手術にご用意していただくものは、下記のとおりです。 ・タオルや病衣はCSセットに含まれます。 ・T字帯1枚またはオムツ1枚 ・ストロー付きコップ ・ズック(スリッパやクロックスは転ぶ危険性があるので使用しないでください。) 私物には名前を書いてください。		必要時手術部位の毛ぞりをします。男性の方はひげを剃ってください。女性は髪を結べるようにしてください。マニキュアや化粧、指輪、その他アクセサリーなどを外せるかどうか確認します。 	朝に浣腸をします。	血栓症予防のために下肢にフットポンプ(間欠的空気圧迫)を装着します。	
			洗面・歯磨き・ひげそりは日頃通り行ってください。お化粧・マニキュア・指輪はしないでください。手術に出る前にトイレをすませ、手術衣に着替えてベッドで静かに休んでください。弾性ストッキングを手術をしないほうの足に履きます。医師が手術をする足に間違い予防のために印をつけます。		創部に血がたまらないようにする管が入ってきます。触らないようにしてください。	
					尿を出す管が入っています。 	
					酸素マスクをします。 	
食事	朝	食事の制限はありません。手術後は足に血栓ができやすくなるため、積極的に水分をとってください。 	 食事、水分は取らないで下さい。			
	昼		 食事、水分は取らないで下さい。手術後からうがいはできます。希望される場合には看護師にお知らせください。			
	夕					
清潔	清潔のためシャワーをします。シャワーできない方は体を拭き、洗髪します。 					
その他	入院セット(CSセット)の加入をお勧めします。手術前のオリエンテーションと、弾性ストッキングをお渡しします。手術後の目標やリハビリの進行状況がわかるリハビリテーション用紙を記載していきます。杖、ボディブラシ、マジックハンド(必要時)を用意してください。		手術を想定して、脱臼予防のための枕を足の間に挟んで、体の向きを変える練習をします。医師から手術の説明があります。家族も同席してください。同意書に署名し看護師に提出してください。  	午前の手術の場合は8時30分に手術室に到着するように、病棟を出ます。午後からの手術の場合は呼び出しになります。手術の後は、病室が変わることがあります。病室が変わる場合はお知らせします。貴重品はご家族もしくは看護師にお預けください。	創の痛みが強い時や気分が悪い時、新たにしびれが感じられた時には我慢せずナースコールを押してください。 	

※治療内容、入院期間については状態に応じて予定が変更される場合があります。

人工股関節置換手術を受けられる方へ

2/2枚目

日付	/	/	/ ~ /	/	/	/	/	
経過	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目～10日目	手術後11日目	手術後12日目	術後13日目	術後14日目	
治療	測定	  体温、脈拍、血圧を測定します。						
	安静度	ベッドは朝ごはんの際に看護師が起こします。手術した足は体重をかけてもいいので、午前中に車椅子に乗ります。  リハビリに合わせて車椅子⇒歩行器歩行⇒杖歩行⇒何も使わず歩行となっていきます。						
	処方	痛みがあれば痛み止めの内服や坐薬を使用します。		採血の結果次第で抗生剤の薬、リクシアナ(血液をサラサラにする薬)を飲み始めます。				
	注射	抗生剤の点滴をします。 	抗生剤の点滴をします。 					
	リハビリ	リハビリテーションを開始します。歩行訓練、筋力トレーニングを中心にリハビリを毎日(土、日、祝日は休み)行います。土、日、祝日は自己練習してください。						
処置	医師の指示に従い血栓症予防のためフットポンプを装着します。	医師の指示があれば(歩行できるようになれば)弾性ストッキングを脱ぎ、フットポンプを外します。						
	創部に血液が溜まらないようにする管を医師が抜きます。	 適宜ガーゼ交換をします。						
	 術後初めてベッドから車いすに乗る際に尿を出す管を抜きます。管を抜いて初めての尿は量や性状を見るために検査トイレで看護師が確認します。	週1回程度のレントゲン撮影、採血があります。						
車いすに移乗する時、ベッドで寝る時はお渡ししている枕を足の上に挟んでください。								
食事	朝	 朝ごはんの際にお腹の動きを確認し水分・食事の許可がでます。飲み、食べ始めはむせる恐れがあるため看護師が見守ります。						
	昼							
	夕	 食事の制限はありません。						
清潔	ベッドの上で体を拭いて病衣を交換します。 		体ふきやシャンプーは適宜行います。 		創がきれいになり、創口をとめている針が抜ければガーゼをとり、シャワーが可能になります。(術後7日目～10日目) 			
その他	不良肢位に注意し、車いすに乗る時やトイレの時など必要時ナースコールを押してください。				退院の目安は、手術後約2週間で、杖で歩行できることです。それ以上リハビリが必要になる場合は、転院してリハビリを継続します。 			
							退院の説明をします。外来受診予約票をお渡します。 	

※治療内容、入院期間については状態に応じて予定が変更される場合があります。